

een onbekend broertje van *Eucharis*



Ondanks de overeenkomsten heeft *Caliphruria* niet de bekendheid, die *Eucharis* heeft. Daarnaast komen ze minder in cultuur voor dan die van *Eucharis*. Je komt ze maar sporadisch tegen in de prijslijsten van de verschillende nationaal en internationaal opererende handelaren en kwekers. Ook wordt er in de literatuur maar weinig geschreven over het geslacht. Zelfs in een zeer uitgebreid bollenboek als 'Manual of Bulbs' van John Bryan en Mark Griffiths wordt *Caliphruria* niet genoemd. Als je wilt weten hoeveel aandacht er op het world wide web wordt besteed aan *Caliphruria*, tik



De bloeitijd is mei-juni. Daarnaast kan de plant, afhankelijk van temperatuur en hoeveelheid zonlicht, nog een tweede keer bloeien in oktober-november. De bloemen kunnen zichzelf bevruchten. De zaden zijn donkerbruin van kleur. Ze worden direct gezaaid, nadat de zaaddoos is opengesprongen. Binnen enkele weken zullen de zaden kiemen en wordt een bolletje en een blad gevormd.

Caliphruria korskoffii

Eucharis is één van de bekende in Zuid Amerika voorkomende vertegenwoordigers van de familie der Amaryllidaceae. Het geslacht omvat zeventien soorten en kent voor het geslacht karakteristieke, geurende bloemen: wit, hangend en de meeldraden, die een, eveneens witte, cup vormen. Nauw verwant aan *Eucharis* is *Caliphruria*. Dit laatste geslacht omvat slechts vier soorten. Het verspreidingsgebied van *Caliphruria* is beperkt tot het westelijk gedeelte van Colombia en Peru. Evenals *Eucharis* soorten vormen de *Caliphruria* soorten leerachtige, glimmende bladeren, die aan een bladsteel staan. Beide families zijn groenblijvend en warmteminnend. In de natuur groeien de planten in de regenwouden.

bij een willekeurige zoekmachine de naam van het geslacht maar eens in en laat 'm zoeken.

Zoals gezegd omvat *Caliphruria* vier soorten, te weten *C. hartwegiana*, *C. subedentata*, *C. tenera* en *C. korskoffii*. Alleen de laatstgenoemde komt op kleine schaal voor in cultuur. *Caliphruria korskoffii* vormt een bijna ronde bol, die een diameter van drie centimeter kan bereiken. De buitenzijde van de net onder het grondoppervlak groeiende bol is bezet met enkele verdroogde, bruin gekleurde rokken. Uit de bol groeien twee tot vier ovaal- tot lancetvormige bladeren. De tien tot twaalf bloemen lijken op die van *Eucharis x grandiflora*, maar dan een kleine, niet geurende uitvoering. Ze kunnen een diameter bereiken van circa twee tot drie centimeter. De bloemen blijven meerdere dagen open.

Caliphruria korskoffii is niet moeilijk te kweken. De plant verlangt gedurende het gehele jaar een temperatuur van meer dan 10 °C. Het is dus een plant, die in de huiskamer of een verwarmde kas kan worden gekweekt. Een zonnige standplaats voldoet goed. Verder krijgt de plant gedurende het gehele jaar water: in de zomer meer dan in de winter. In de periode oktober-april worden géén nieuwe bladeren gevormd. Net als bij andere bolgewassen moet de plant af en toe nagekeken worden op het voorkomen van wolluis. Dit bestje kan met name worden aangetroffen tussen de bovenzijde van de verdroogde rokken.

Tekst en foto's Peter Knippels

Literatuur

Meerow, A.W. Systematics of the Amazon Lilies, *Eucharis* and *Caliphruria*. Annals of the Missouri Botanical Garden, 1989, (76), 136-220.